


Critères cliniques de diagnostic de l'anaphylaxie^{1*}

L'anaphylaxie est très probable en présence d'un des deux signes suivants :


01

Apparition soudaine d'une maladie (de quelques minutes à plusieurs heures) **qui implique la peau, les muqueuses ou les deux simultanément** (p. ex., urticaire généralisé, prurit ou rougeur, inflammation des lèvres, de la langue et de la lèvre) **et au moins un des éléments suivants :**




Respiration affaiblie

(par ex., dyspnée, sibilance ou bronchospasme, stridor, DME[†] réduit, hypoxémie)



PA[‡] réduite ou symptômes associés à la dysfonction des organes cibles

(p. ex., hypotonie [collapsus], syncope, incontinence)



Symptômes gastro-intestinaux graves

(p. ex., crampes abdominales sévères, vomissements répétés), en particulier après une exposition à des allergènes non alimentaires

02

Apparition soudaine d'une hypotension, d'un bronchospasme ou d'une affection du larynx après l'exposition à un allergène connu ou très probable pour ce patient (de quelques minutes à plusieurs heures), même en l'absence d'implication cutanée typique.

*Ces critères doivent être vérifiés dans le cadre d'un essai clinique multicentrique prospectif visant à établir leur utilité et à déterminer s'il y a lieu de les préciser


[†] DME = Débit maximal expiratoire.

[‡] PA = Pression artérielle.

Faites en sorte que vos patients à risque soient toujours prêts à réagir grâce à l'autoinjecteur EpiPen^{MD} (épinéphrine)².

EpiPen^{MD}

Chez les adultes et les enfants pesant 30 kg (66 lb) ou plus



EpiPen Jr^{MD}

Chez les enfants pesant de 15 à 30 kg



Les patients/soignants doivent être informés qu'après chaque utilisation d'un autoinjecteur EpiPen^{MD} ou EpiPen Jr^{MD} :

- Puisque les autoinjecteurs EpiPen^{MD} et EpiPen Jr^{MD} sont destinés uniquement au traitement d'urgence, les patients devraient toujours solliciter des soins d'urgence immédiats.
- Lorsque les patients sont conscients, il est préférable qu'ils adoptent une position allongée avec élévation des pieds, mais ils doivent s'asseoir s'ils éprouvent des difficultés à respirer. Les patients inconscients devraient être placés sur le côté en position de récupération.
- Dans la mesure du possible, les patients devraient rester avec une autre personne jusqu'à ce que l'aide médicale arrive.

Mode d'emploi des autoinjecteurs EpiPen^{MD} et EpiPen Jr^{MD}

Bleu vers le plafond. Orange pour l'injection.



Bleu vers le plafond

1

- Saisissez l'autoinjecteur, le bout orange pointant vers le bas.
- Enlevez le bouchon de sécurité bleu en le tirant tout droit – ne le pliez pas et ne le tordez pas.



Orange pour l'injection.

2

- Placez le bout orange contre le milieu de la cuisse externe.
- Poussez fort contre la jambe jusqu'à ce que vous entendiez un « pop » qui signale le début de l'injection.
- Tenez l'autoinjecteur en place pendant 3 secondes complètes.

Couvre-aiguille intégré

- Le couvre-aiguille orange s'étend automatiquement après l'injection pour couvrir l'aiguille et assurer que celle-ci n'est jamais exposée. Après l'administration, les patients doivent avoir immédiatement recours aux soins d'un médecin ou se rendre à l'urgence. **Durant les 48 heures suivantes, ils doivent s'assurer de demeurer à proximité d'un établissement de santé ou d'un endroit d'où ils peuvent composer le 911**



Commandez votre trousse d'initiation GRATUITE sur notre site Web EpiPen.ca/fr.

Indications et usage clinique :

- Les auto-injecteurs EpiPen^{MD} et EpiPen Jr^{MD} sont indiqués pour le traitement d'urgence des réactions anaphylactiques chez les patients qui présentent des risques accrus d'anaphylaxie, y compris les personnes ayant des antécédents de réactions anaphylactiques.
- Le choix de la concentration pertinente est déterminé en fonction du poids du patient.
- L'injection se fait sur le côté extérieur d'une cuisse.
- Après le traitement de l'anaphylaxie, le patient doit composer le 911.

Il n'y a pas de contre-indication absolue à l'utilisation de l'épinéphrine dans une situation d'allergie potentiellement mortelle.

Mises en garde et précautions pertinentes :

- L'utilisation d'épinéphrine doit être évitée chez les patients atteints de choc cardiogène, traumatique ou hémorragique, de dilatation cardiaque ou d'artériosclérose cérébrale, ainsi que chez les patients souffrant d'atteinte cérébrale organique ou de glaucome à angle fermé.
- Utiliser avec prudence chez les patients souffrant d'arythmie cardiaque, de coronaropathies, de maladies organiques du cœur, d'hypertension artérielle ou d'hyperthyroïdie.

- Sensibilité aux sulfites
- Diabète
- Maladie de Parkinson
- L'administration d'épinéphrine n'est pas destinée à remplacer des soins médicaux d'urgence; le patient doit immédiatement consulter un médecin ou se rendre à un hôpital.
- Il ne faut administrer plus de deux doses d'épinéphrine de suite que sous la supervision directe d'un médecin.
- Le patient ou son aidant doit être avisé de la possibilité d'une anaphylaxie biphasique.
- L'épinéphrine ne doit être injectée que dans la partie antérolatérale de la cuisse. Tenir fermement la jambe de l'enfant pendant l'injection.
- Effet sous-optimal chez les patients dont la couche de graisse sous-cutanée est plus épaisse.
- Infections au point d'injection.

Pour de plus amples renseignements :

Veillez consulter la monographie de produit à l'adresse <https://produits-sante.canada.ca/dpd-bdpp/index-fra.jsp> pour obtenir de plus amples renseignements sur les conditions d'usage clinique, les contre-indications, les mises en garde, les précautions, les effets indésirables, les interactions et la posologie. La monographie de produit peut également être obtenue en communiquant avec BGP Pharma ULC au 1 844 596-9526.

Références :

1. Cardona V, Ansotegui IJ, et al. World allergy organization anaphylaxis guidance 2020. *World Allergy Organ J.* 30 octobre 2020;13(10):100472.
2. Monographie de produit de EpiPen, <https://produits-sante.canada.ca/dpd-bdpp/index-fra.jsp>

Scannez le code QR pour visionner une vidéo explicative.
www.epipen.ca/fr-ca



Éprouvé depuis plus de 35 ans.

EpiPen^{MD} and EpiPen Jr^{MD} sont des marques déposées de Mylan Inc., utilisées avec permission par BGP Pharma ULC, une société de Viatris.
VIATRIS et VIATRIS & Design sont des marques déposées de Mylan Inc., utilisées avec permission par BGP Pharma ULC, une société de Viatris.
©2025 Viatris Inc. Tous droits réservés.
CA-EPI-2024-00004F – OC2024

